

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad praėjusią savaitę afrikinis kiaulių maras (AKM) nustatytas 4 sumedžiotiems šernams bei 14 šernų gaišenu.

Du šernai buvo sumedžioti Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.), vienas – Širvenos (Biržų r.) ir vienas – Upninkų (Jonavos r.) seniūnijų miškuose. 7 gaišenos rastos Širvenos (Biržų r.), 3 – Troškūnų (Anykščių r.) ir 4 – Miežiškių (Panevėžio r.) seniūnijų teritorijose.

„AKM situacija ir toliau išlieka grėsminga, kadangi Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse vos ne kasdien nustatomi nauji maro atvejai laukinėje faunoje. Ši liga nesitraukia ir, artėjant pavasariui, padidėja rizika jai išplisti kiaulių laikymo vietose. Todėl išspėjame kiaulių laikytojus, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba netoleruos biologinio saugumo reikalavimų nepaisymo, bus taikomos itin griežtos priemonės. Ūkininkai, neįgyvendinę šių reikalavimų, bus skatinami atsisakyti kiaulininkystės. Tokiomis priemonėmis siekiama išvengti didelių buferinių zonų nustatymo,

kuomet papuolus į zonos teritoriją, visuose nekomerciniuose kiaulių ūkiuose privaloma paskersti laikomas kiaules. Taip pat siekiama išvengti protrūkių ir naujų III zonų steigimo, kas atneša didelius ekonominius nuostolius visam kiaulininkystės sektoriui. Šiais metais visos nekomercinės kiaulių laikymo vietos bus tikrinamos itin griežtai dėl biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo“, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis.

Nuo šių metų pradžios AKM Lietuvoje nustatytas 26 vietose 50 šernų (10 sumedžiotų ir 40 nugaišusių).

