

Šią savaitę (gegužės 6 – 12 d.) Lietuvoje afrikinis kiaulių maras (AKM) patvirtintas 3 sumedžiotiems ir 5 šernų gaišenoms. 4 šernų gaišenos rastos Troškūnų (Anykščių r.) ir 1 – Papilio (Biržų r.) seniūnijų miškuose, po 1 šerną sumedžiota Troškūnų (Anykščių r.), Velžio (Panevėžio r.) ir Papilio (Biržų r.) medžioklės plotuose. „Šylant orams, tikimybė, kad AKM virusas pateks į ūkius, itin padidėja dėl gyventojų veiklos užkrėstuose miškuose arba laukuose. Ypatingai budrūs turi būti kiaulių augintojai, kuriems dar kartą privalu peržiūrėti taikomas biologinio saugumo priemonės, įsitikinti, kad naudojamos dezinfekcinės medžiagos yra efektyvios prieš AKM virusą, o taikomos priemonės ne vien dėl inspektorių, bet realiai ūkio apsaugai, nes tik laikantis visų biologinio saugumo reikalavimų, galima išvengti AKM patekimo į kiaulių ūkį“, – primena Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis. Nuo šių metų pradžios AKM laukinėje faunoje patvirtintas 175 vietose 364 šernams (22 sumedžiotiems ir 342 nugaišusiems).

