

Lietuvoje įsivyravus šaltiems orams, suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, vasario 22 d. duomenimis kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros vidurkis visuose šalies miestuose viršijo ribinę vertę. Panevėžyje užfiksuota 58 mikrogramų 1 kub. m tarša (maksimalus leistinas KD10 kiekis – 50 mikrogramų).

„Oro taršai įtakos turi prasidėjęs patalpų šildymo sezonas, ypač iš privačių namų sklindantys dūmai. Norėtume atkreipti panevėžiečių dėmesį į tai, kokiomis medžiagomis šildo savo namus. Kai kurios jų itin kenkia ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai“, – sako Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Rūta Taučikienė.

Primename: dėl pavojaus žmonių sveikatai ir kenksmingumo aplinkai draudžiama deginti plastikinius maišelius, plastikinę tarą, cheminėmis medžiagomis užterštas pakuotes, užterštą medieną, makulatūrą, medžio drožlių plokštes ir kt. atliekas.

Tarša kietosiomis dalelėmis lemia sergamumą kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Esant normą viršijančiam užterštumui, nėščiosioms, vaikams bei žmonėms, sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis, patariama kuo mažiau būti lauke. Būnant lauke, atvirame ore ir pajutus kvėpavimo takų sudirginimo simptomus kosulį, nosies gleivinės dirginimą, slogą, gerklės gleivinės dirginimą, ar akių perštėjimą, niežėjimą, paraudimą, ašarojimą, patariama grįžti į uždaras patalpas ir būti jose. Tokio pobūdžio simptomai yra trumpalaikiai ir uždaroje patalpoje turi greitai praeiti. Jiems nepraėjus, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją.

Sirupio gatvėje esančioje oro kokybės stebėjimo stotyje nuo metų pradžios iki vasario 22-osios užfiksuotos 2 dienos, kai oro tarša kietosiomis dalelėmis viršijo taršos normą. Tuo tarpu pagal LR aplinkos oro apsaugos įstatymą, per metus taršos normą leidžiama viršyti ne daugiau kaip 35 dienas.

Sinoptikai toliau prognozuoja ramius, šaltus orus be didelio vėjo, kuris padėtų teršalams išsisklaidyti. Aplinkos specialistai mano, kad tarša vasario 23-25 dienomis gali išaugti. Tokiu atveju Panevėžyje šiemet būtų jau 5 dienos, kai viršijama KD10 koncentracija.

