

Panevėžio ligoninė pradėjo skiepyti Janssen vakcina

Kaip praneša Respublikinė Panevėžio ligoninė balandžio 29 dieną COVID - 19 vakcina Janssen pradėti skiepyti ligoninės stacionaro skyriuose gydomi prioritetinių grupių pacientai. Imuniniam atsakui susidaryti pakanka vienos šios vakcinės dozės, tad paskiepytiems pacientams vėliau nebereiks papildomai atvykti į mūsų gydymo įstaigą.

Apsauga nuo COVID - 19 ligos prasideda praėjus maždaug 14 dienų po skiepavimo. Ši vakcina yra patogi naudoti - viename buteliuke yra penkios vakcinės dozės ir jų nereikia skiesti. Visi ligoninės pacientai, kurie pageidautų būti paskiepyti šia vakcina, yra išsamiai supažindinami su vakcinės COVID - 19 Vaccine Janssen informaciniu lapeliu bei turi pasirašyti asmens informavimo apie skiepus ir sutikimo formą, nurodyti pageidaujamą skiepavimo datą.

Respublikinės Panevėžio ligoninės pacientai šia vakcina yra skiepjami pagal prioritetinių asmenų grupių sąrašą, į kurį įeina: galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pacientai, kuriems yra taikoma hemodializė ar peritoninė dializė, pacientai, kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, pacientai, sergantys piktybinėmis kraujų ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujų ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 24 mėnesius, pacientai, sergantys imunodeficitu su antikūnų gamybos defektu, asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems yra taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spinduline terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėnesiai, asmenys, sergantys žmogaus imunodeficitu viruso (ŽIV) sukelta liga, 65 metų ir vyresni asmenys, jaunesni kaip 65 metų asmenys, turintys tam tikrą rizikos veiksnių, asmenys, sergantys cukriniu diabetu, su komplikacijomis, sergantys lėtinėmis širdies - kraujagyslių ligomis, lėtinėmis plaučių ligomis su kvėpavimo nepakankamumu, lėtinėmis kepenų ligomis, kuriems yra diagnozuota tetraplegija, nutukimas ir kūno masės indeksas yra 35 ir daugiau, taip pat asmenys, sergantys nervų ir raumenų sistemos ligomis (uždegimine polineuropatija, kitomis polineuropatijomis, mioneuralinių jungčių ir raumenų sutrikimais sergant kitomis ligomis) ir patiriantys kvėpavimo sutrikimus, asmenys, kuriems diagnozuotos imunodeficitinės būklės dėl hiposplenizmo, asplenijos po procedūros, blužnies atrofijos, išskyrus įgimtą aspleniją, kiti patikslinti imunodeficitai, asmenys, sergantys onkologine liga, kuriems po aktyvaus gydymo ir (ar) ligos remisijos praėjo daugiau nei 24 mėnesiai, bet ne daugiau nei 60 mėnesių, organo(-ų) ar audinio(-ių) transplantacijos laukiantys recipientai.

Vakcina COVID - 19 Vaccine Janssen yra padalinta visoms Panevėžio ir Utenos apskrityse esančioms gydymo įstaigoms, siekiant visiems užtikrinti tolygų ir socialiai teisingą vakcinės

Panevėžio ligoninė pradėjo skiepyti Janssen vakcina

paskirstymą ir prieinamumą bei vienodą šiose gydymo įstaigose besigydančių pacientų galimybę pasiskiepyti. Gydymo įstaigoms rekomendavome, laikantis LR SAM nustatytos tvarkos reikalavimų, pradėti skiepyti pacientus nuo pirmadienio.

