

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, 2020 m. sausį Lietuvoje registruota 52 proc. daugiau Laimo ligos atvejų nei prieš metus, o draudikų statistika rodo, jog didžiausia erkių platinamų ligų rizika yra Panevėžio ir Vilniaus apskrityse.

Tuo tarpu Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras (ECDC) dar gruodį paskelbė, kad sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje lieka didžiausias Europos Sąjungoje (ES).

„Skirtingai nei prieš kelerius metus, praėjusiais metais susirgimų Laimo liga ir erkiniu encefalitu atvejų fiksavome kiekvieną mėnesį, net ir šaltuoju metų periodu. Tai patvirtina sveikatos specialistų prognozes, jog šylant klimatui erkių platinamų ligų pavojus lieka visus metus“, – sako draudimo bendrovės BTA asmens draudimo produktų vadovas Ronaldas Grizickas.

Daugiausia atvejų – Vilniaus ir Panevėžio regionuose

Iš 77 pernai BTA klientų registruotų Laimo ligos atvejų net 15 įvyko Vilniaus apskrityje, 12 – Panevėžio. Kitose šalies apskrityse susirgimų Laimo liga skaičius svyravo nuo 1 iki 8.

„Vilniaus ir Panevėžio regionai jau kelerius metus išsiskiria didesniu susirgimų erkių platinamomis ligomis skaičiumi. Beje, kaip rodo mūsų klientų pranešimai, užsikrėsti Laimo liga ar erkiniu encefalitu galima ir neužsiimant poilsio ar darbine veikla miškuose – erkių pavojus ne mažesnis ir miestų parkuose, soduose, pievose“, – įspėja draudimo ekspertas.

Susirgimų – vis daugiau

ULAC duomenimis, šių metų sausį Lietuvoje užfiksuoti 64 susirgimo Laimo liga atvejai. Tai – 52 proc. daugiau nei 2019 m. sausį (42 atvejai).

Tuo tarpu Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras 2019 m. gruodį paskelbė naujausią sergamumo erkiniu encefalitu ES ataskaitą. Jos duomenimis, 2018 m. didžiausias sergamumo lygis buvo Lietuvoje, kur 100 tūkst. žmonių teko net 13,5 susirgimo erkiniu encefalitu atvejų.

Antroje vietoje esančioje Slovėnijoje sergamumas beveik dukart mažesnis – 7,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Austrijos pavyzdys rodo – skiepai padeda

Veiksmingiausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė – skiepai. Kaip skelbia ULAC, 1982 m. Austrijoje, kurioje sergamumo rodiklis siekė 8,75 atvejo 100 tūkst. gyventojų, pradėta visuotinė žmonių vakcinacija nuo erkinio encefalito. Šiuo metu, kai 80 – 90 proc. Austrijos gyventojų yra pasiskiepiję nuo šios ligos, susirgimų sumažėjo daugiau kaip 12 kartų.

ULAC medikai skiepytis nuo erkinio encefalito pataria šaltuoju metų periodu. Šiomis vakcinomis galima skiepyti vyresnius nei 1 metų vaikus. Vakcinavimo schemas yra dvi: įprastinė ir pagreitinta. Įprastinės skiepijimo schemas atveju pirmosios dvi dozės išskiepiamos 1-3 mėn. intervalu, trečiosios ir sustiprinančiųjų dozių išskiepijimo intervalai gali būti skirtingi. Pagreitinta skiepijimų nuo EE schema taikoma prieš pat erkių aktyvumo

sezoną ar jam jau prasidėjus.

